

# Kuron<sup>TM</sup> 16 SL

## Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - PIRIDINA, FENOXI PICLORAM, 2,4-D

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS**

### Composición química:

	p/v
4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid.....	4 %
(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid.....	12 %
Inertes.....	84 %
Total.....	100,00 %

**Contiene:** 160 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

## PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE.

**DENSIDAD:** 1,075 g/L a 20 °C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.  
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



### FORMULADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia, S.A.  
A. A. 2888, Mamonal, Cartagena, Colombia. Teléfono: (575) 668 - 8000

® <sup>TM</sup> Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

# Kuron™ 16 SL

## Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - PIRIDINA, FENOXI PICLORAM, 2,4-D

### USO AGRONÓMICO

#### MODO DE ACCIÓN:

Es un herbicida sistémico, selectivo a las gramíneas, a base de picloram y 2,4-D para el control de malezas de hoja ancha semileñosas y herbáceas presentes en potreros. Dicho herbicida bloquea el proceso normal de crecimiento, lo cual conlleva a la pérdida de la función de las raíces, bloqueo del floema, inhibición de la fotosíntesis y finalmente la muerte.

#### EQUIPO DE APLICACIÓN:

Antes de aplicar póngase equipo de protección completo y asegúrese de que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado.

Si se aplica vía aérea utilice de 50 a 70 litros de caldo, según sea el caso, si se aplica por vía terrestre utilice de 300 - 400 litros de caldo y utilizando una boquilla SS8002.

Aplíquese a presiones bajas de 1,4 - 2,1 kg/cm<sup>2</sup> (20 a 30 lb/pulg<sup>2</sup>) y preferiblemente cuando no haya viento y a temperaturas de 20 a 30° C.

No es corrosivo.



#### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene hasta la mitad con agua limpia el tanque de mezcla, agregue la dosis recomendada de **Kuron™ 16 SL**, agite y termine de llenar con agua y agite.

Después de terminada la aplicación, lavar el equipo y darle el mantenimiento adecuado.



#### RECOMENDACIONES DE USO:

Para: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.



Dow AgroSciences

# Kuron™ 16 SL

## Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - PIRIDINA, FENOXI PICLORAM, 2,4-D

CULTIVO	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADAS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Arroz, <b>Oryza sativa</b>	Viborana, <b>Asclepias curassavica</b> Frijolillo, <b>Cassia tora</b> Camaroncillo, <b>Blechnum pyramidatum</b> Cinquillo, <b>Drymaria cordata</b> Dormilona, <b>Mimosa pudica</b>	2 - 4 L/ha en 200 - 400 litros de agua o sea al 1% v/v	Aplicar <b>Kuron™ 16 SL</b> cuando la maleza se encuentre en estado de crecimiento activo, antes de su floración. Esta debe tener suficiente follaje.
	Bledo, <b>Amaranthus sp.</b> Churristate, <b>Ipomoea sp.</b> Cinco negritos, <b>Lantana camara</b>	(1,7 - 2,8 L/mz en 150 - 300 litros de agua)	
Caña de azúcar, <b>Saccharum officinarum</b>	Cornisuelo, <b>Acacia cornigera</b> Churrite, <b>Hyptis capitata</b> Uva cimarrona, <b>Cissus sicyoides</b> Clavito, <b>Ludwigia decurrens</b>	4 - 8 L/ha en 200 - 400 litros de agua o sea al 2% v/v	
Pastos	Tuete, <b>Vernonia patens</b> Zarza, <b>Mimosa pigra</b>	(2,8 - 5,6 L/mz en 150 - 300 litros de agua)	

### INTERVALO DE APLICACIÓN:

En caso de ser necesaria una segunda aplicación se debe esperar de 30 - 45 días entre la primera aplicación y la segunda.

### INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y EL INGRESO DEL GANADO AL PASTO TRATADO:

Para animales lactantes dejar al menos 7 días, para animales no lactantes no hay restricción. Si el pasto será utilizado como alimento, esperar al menos 30 días antes de cosecharlo.

### INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Espere un lapso de 1 día, o en caso contrario utilice el equipo de protección completo.

### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis y a los cultivos recomendados en este panfleto. Por deriva daña cultivos susceptibles como: papa, papaya, tomate, chile y otros cultivos anuales y perennes de hoja ancha.

### COMPATIBILIDAD:

Es compatible con paraquat, diuron, propanil, atrazina, ametrina. No se mezcle con medios ácidos o básicos fuertes.

# Kuron<sup>TM</sup> 16 SL

## Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - PIRIDINA, FENOXI PICLORAM, 2,4-D

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Transporte y almacene el producto en lugares secos, seguros, aireados, lejos de alimentos, forrajes, medicinas, semillas, etc. Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente, etiquetado y con su panfleto.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



#### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Los síntomas de intoxicación que se presentan son quemaduras en la boca, esófago y estómago así como irritación de los ojos, nariz y garganta. Cuando se absorbe en cantidades excesivas produce vértigo, dolor de cabeza, adormecimiento de las extremidades, dolores musculares, espasmos seguidos de una profunda debilidad muscular.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

**POR INGESTIÓN:** Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para recibir consejos acerca del tratamiento. No induzca el vómito a menos que así lo recomiende en el centro de control de intoxicaciones o el médico. Nunca administre nada por la boca cuando la persona se encuentra inconsciente.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

**POR INHALACIÓN:** Retire el paciente a un lugar ventilado, seco y aireado. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lave la parte afectada por espacio de 15 minutos con agua limpia.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

#### ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático.

#### CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información Toxicológica. Centro de Intoxicaciones.	(502) 2230-0807 (502) 2232-0735
Belice	Unidad de Epidemiología.	(501) 223-1639
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext. 17
Costa Rica	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones.	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos.	(507) 523-4948 (507) 523-4968
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan) Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 684-3478/3672 (809) 681-7828

# Kuron<sup>TM</sup> 16 SL

## Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - PIRIDINA, FENOXI PICLORAM, 2,4-D

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

**CONSULTE AL PROFESIONAL  
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE  
COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.**

**PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS  
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS  
RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.**

### TÓXICO PARA EL GANADO.

No pastoree dentro de los 45 días después de aplicado el producto.



### TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS, ESTANQUES U  
OTRAS FUENTES DE AGUAS SUPERFICIALES O  
SUBTERRÁNEAS CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

### MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES  
EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE  
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO  
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

### AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente, no se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en este panfleto y etiqueta.

PAÍS	No. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	479-15	11-06-1998
BELICE	0096-10M	12-12-1996
EL SALVADOR	AG-95-05-229	31-07-1998
HONDURAS	261-131-I	05-08-1999
COSTA RICA	2855	08-06-1995
PANAMÁ	1726	13-03-1995
REP. DOMINICANA	2656	02-12-2005
NICARAGUA	DW-01A-2-93	03-06-1993