



RECUBRE
SU CULTIVO

Cobrethane™ 61,1 WP

FUNGICIDA

RENOVADO

El fungicida de composición equilibrada que le ofrece un excelente control en la prevención de hongos y bacterias, además de mejor cobertura y mayor adherencia.

¿Qué es Cobrethane™ 61,1WP

Cobrethane™ 61,1 WP es un fungicida protectante de amplio espectro que tiene las propiedades del mancozeb, el oxiclورو de cobre y el complejo férrico. De gran actividad contra hongos y bacterias en los cultivos.

Modo de Acción

El efecto de **Cobrethane™ 61,1 WP** es preventivo; por lo tanto, es necesario aplicarlo antes de aparecer los primeros síntomas o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de las enfermedades fúngicas y bacterianas.

CARACTERÍSTICAS

- Su efecto fungicida permite que la planta permanezca sana por más tiempo.
- El hierro (Fe) de **Cobrethane™ 61,1 WP** ayuda en los procesos enzimáticos y de síntesis de clorofila.
- Los elementos menores (Mn+2, Zn+2, Fe+2) que aporta son totalmente disponibles para la planta.



Recomendaciones de Uso

País	Cultivos	Enfermedad	Dosis	Recomendaciones
Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana	Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>	2- 3 kg /ha (1.5 – 2 kg/mz)	Empezar las aplicaciones con los primeros indicios de enfermedad y mantener frecuencia de aplicación de cada 7 a 15 días
	Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria solani</i> Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Antracnosis, <i>Colletotrichum phomoides</i> Septoriosis <i>Septoria spp</i>	2- 3 kg /ha (1.5 – 2 kg/mz)	
	Chile <i>Capsicum annum</i>	<i>Cercospora Cercospora capsici</i> Antracnosis <i>Colletotrichum spp</i>	2- 3 kg /ha (1.5 – 2 kg/mz)	
	Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mancha purpura, <i>Alternaria porri</i>	2-3 kg/ha (1.5 – 2 kg/mz)	
	Café <i>Coffea arabica</i>	Roya <i>Hemileia vastatrix</i> <i>Cercospora Cercospora coffeicola</i> Tela de araña <i>Pellicularia koleroga</i>	3 kg/ha (2 kg/mz)	
	Melón <i>Cucumis melo</i> Sandía <i>Citrullus vulgaris</i> Calabaza <i>Cucurbita pepo</i>	Bacteriosis <i>Acidovorax avenae ssp citrulli</i>	2- 3 kg /ha (1.5 – 2 kg/mz)	
	Mango <i>Mangifera indica</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum spp</i>	3 kg/ha (2.1 kg/mz)	
Panamá	Cucurbitáceas	Bacteriosis <i>Acidovorax avenae ssp citrulli</i>	2- 3 kg /ha (1.5 – 2 kg/mz)	
Costa Rica	Arroz <i>Oryza sativa</i>	Manchado de grano <i>Fusarium spp.</i> <i>Curvularia sp.</i> <i>Penicillium sp.</i> <i>Alternaria sp</i> <i>Nigrospora sp.</i> <i>Colletotrichum sp.</i>	2 kg/ha (2.1 kg/mz)	Realizar la primera aplicación al inicio del espigamiento y la segunda al completar el 100%. Utilizar un volumen de aplicación de 160 l/ha
		<i>Pyricularia grisea</i>	0.25 kg por saco de 45 kg de semilla	Dosificar el COBRETHANE™ 61,1 WP en un volumen de 500 – 700 ml para 45 kg de semilla

INTERVALO DE APLICACIÓN: En hortalizas, melón, sandía y cucurbitáceas se debe aplicar cada 7 a 15 días. En café se debe aplicar cada 30 a 45 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 8 días para hortalizas y 21 días para café y frutales. En Rep. Dominicana para chile, melón y sandía 10 días, para cebolla 15 días y para mango 20 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Las áreas tratadas con COBRETHANE 61,1 WP pueden ser inspeccionadas 24 horas después de efectuada la aplicación. Si va en mezcla con otro agroquímico ver en el panfleto la restricción del mismo. Espere a que la aplicación haya secado.



Categoría Toxicológica: IV – Precaución– Franja: Verde
Teléfonos de Emergencia: **Guatemala:** (502) 2230-0807 – (502) 2232-0735 / **El Salvador:** (503) 2231-9262 / **Honduras:** (504) 2232-2322 / **Nicaragua:** (505) 2289-4700 ext. 1294 – (505) 8755-0983 / **Costa Rica:** (506) 2223-1028 / **Panamá:** (507) 523-4948- (507) 523-4968 / **República Dominicana:** (809) 684-3478 / 3672 – (809) 681-7828. Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

PAIS	No. de Registro
Guatemala	479-49
El Salvador	98-01-481
Honduras	195-98-II
Panamá	1835
Costa Rica	4050
Rep. Dominicana	2059