

Indar™

24 SC

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - TRIAZOLE FENBUCONAZOLE

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS**

Composición química:

	p/v
Fenbuconazole: a-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-a-phenyl-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile.....	24.00
Ingredientes inertes.....	76.00
Total.....	100.00

Contiene: 240 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

PRECAUCIÓN.

ANTÍDOTO: NO TIENE.

DENSIDAD: 1.05 g/mL, 20 °C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN, MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



FABRICADO Y FORMULADO POR:

Dow AgroSciences LLC, Helena Industries, 434 Fenn Road Cordele, GA, 31010, Estados Unidos.

Dow AgroSciences de Colombia S.A. Diagonal 92 No. 17A - 42. Bogotá, Colombia.

IMPORTADO POR:

R.O. SENIOR, SA. Pablo Casals No. 12 Piantini. Santo Domingo. República Dominicana.

® TM Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

Indar™

24 SC

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - TRIAZOLE FENBUCONAZOLE

USO AGRONÓMICO


MODO DE ACCIÓN:

INDAR™ 24 SC actúa curativa y preventivamente, inhibiendo el ergosterol en la célula del patógeno.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Durante el uso y manejo de **INDAR™ 24 SC**, use el equipo de protección, el cual consiste en anteojos, mascarilla, guantes, botas de hule y overol de mangas largas. No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación de este producto. Antes de utilizar, revise el equipo de aspersión, para verificar que está aplicando el volumen referido.

INDAR™ 24 SC puede ser aplicado con cualquier tipo de boquilla y equipo de aplicación terrestre.




FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Antes de preparar la mezcla agite bien el **INDAR™ 24 SC** en su envase original o en un tanque de mezcla previo al llenado de la máquina de aspersión. Para aplicaciones en banano vierta la cantidad de **INDAR™ 24 SC** a usar en un recipiente aparte y mézclelo con aceite agrícola hasta completar 10 a 12 litros de mezcla cuando se utiliza en solo aceite.

Si se utiliza en emulsión vierta la cantidad total de aceite a utilizar al tanque de la mezcla, agregue el emulsificante y luego la dosis de **INDAR™ 24 SC**, agite hasta homogenizar, vierta el 25% del volumen de agua a utilizar y agite la mezcla por 5 minutos para obtener la emulsión. Vierta el resto de agua a utilizar y continúe agitando.

Para aplicaciones en arroz se recomienda la mezcla previa de la dosis de **INDAR™ 24 SC** con un poco de agua y luego agregue al tanque de aplicación. En todos los casos se recomienda la adición de un coadyuvante para mejorar la calidad de la aplicación.

Después de la aplicación lave el equipo de protección personal y el equipo de aplicación, báñese bien con agua y jabón, póngase ropa limpia. La ropa utilizada no deberá usarla sin ser previamente lavada.



Indar™

24 SC

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - TRIAZOLE FENBUCONAZOLE

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)
Banano <i>Musa spp</i>	Sigatoka <i>Mycosphaerella fijensis</i>	0,5
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Añublo <i>Rhizoctonia solani</i>	0,6 - 0,8

ÉPOCA DE APLICACIÓN:

En banano para obtener los mejores resultados con **INDAR™ 24 SC**, se debe realizar la primera aplicación de forma preventiva, cuando la enfermedad alcance entre 0 y 2% de infección. En arroz se recomienda realizar la aplicación de manera preventiva o con los primeros síntomas de la enfermedad (grado 1).

INTERVALO DE APLICACIÓN:

En banano aplique cada 14 a 21 días. No aplique más de 10 ciclos por temporada. Iniciar el tratamiento con los primeros síntomas de daño. En arroz aplique con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad (primeros focos) o de manera preventiva entre los 40 y 60 días después de la siembra.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

No hay restricción.

INTERVALO DE RE-INGRESO AL ÁREA TRATADA:

24 horas.

FITOTOXICIDAD:

INDAR™ 24 SC no presenta fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD:

INDAR™ 24 SC es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas. Se recomienda realizar una pre-mezcla con los productos a utilizar. No es compatible con clorotalonil.

Indar™

24 SC

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - TRIAZOLE FENBUCONAZOLE

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general. Tanto en el transporte como en el almacenamiento procure que no esté el producto con ningún tipo de herbicida.

Almacénesse bajo llave, en un lugar fresco y seco; alejado del calor.

Los residuos sin usar deben guardarse en su envase original debidamente cerrado y procurando que su etiqueta se encuentre bien adherida.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

No irritante para los ojos. El contacto con la piel puede provocar sensibilización y una reacción dérmica alérgica. La toxicidad por ingestión es baja. No se prevén efectos adversos por la vía inhalatoria si se maneja el producto adecuadamente.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ojos: Lave los ojos contaminados durante 15 minutos mientras mantiene los ojos abiertos. Busque atención médica si la irritación persiste.

Piel: En caso de contacto con la piel lave las partes expuestas con abundante agua y jabón.

Ingestión: No induzca al vómito. Suministre tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua y/u ocho claras de huevo para adultos y cuatro para niños.

Inhalación: Lleve la persona afectada al aire libre y manténgala en reposo.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

Tratamiento médico: El tratamiento es sintomático y de sostén, no se conoce antídoto específico.

CENTROS INTERNACIONALES DE INTOXICACIÓN

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información Toxicológica. Centro de Intoxicaciones.	(502) 2230-0807 (502) 2232-0735
Belice	Unidad de Epidemiología.	(501) 223-1639
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext. 1294 (505) 8755-0983
Costa Rica	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones.	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos.	(507) 523-4948 (507) 523-4968
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan) Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 684-3478/3672 (809) 681-7828

Indar™

24 SC

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - TRIAZOLE FENBUCONAZOLE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

**CONSULTE AL PROFESIONAL
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS
ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.**

**PROTEJA EL AMBIENTE CON
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.
CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES
DADAS EN EL PANFLETO.**

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE
PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

No lo aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES,
DESECHOS Y REMANENTES:**

En el caso de derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y dépositelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno autorizado. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES
EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE
FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO
LA SALUD HUMANA Y DEL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente, no se responsabilizan por el mal uso que se le dé o por usos distintos al señalado en este panfleto.

PAÍSES DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADO:

PAÍS	No. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
República Dominicana	3842	26-12-2011