



Soluciones
en potreros

HERBICIDAS

- CombatranXT™ 22,5 ME**
- Pastar™ D 36 SL**
- TordonXT™ 26 SL**
- Terrano™ D 18,9 SL**
- Dominum™ 12 EO**
- Tronador™ D 18,9 SL**

TordonXT™ 26 SL: No. Registro 479-135 - Categoría Toxicológica V - Franja Verde / Terrano™ D 18,9 SL: No. Registro 479-130A - Categoría Toxicológica V - Franja Verde / Tronador™ D 18,9 SL: No. Registro 479-130A - Categoría Toxicológica V - Franja Verde / Pastar™ D 36 SL: No. Registro 479-131A - Categoría Toxicológica V - Franja Verde / Dominum™ 12 EO: No. Registro 479-105 - Categoría Toxicológica V - Franja Verde - CombatranXT™: No. Registro 479-134 - Categoría Toxicológica V - Franja Verde
Teléfonos de emergencia: Guatemala: (502) 2230-0807 - (502) 2232-0735.

<p>Terrano™ D 18,9 SL HERBICIDA</p> <p>Fulminante y selectivo</p>	<p>CombatranXT™ 22,5 ME HERBICIDA</p> <p>Solución completa y versátil</p>
<p>Dominum™ 12 EO HERBICIDA</p> <p>No le de pasto a la maleza</p>	<p>Pastar™ D 36 SL HERBICIDA</p> <p>Rápido y contundente</p>
<p>Tronador™ D 18,9 SL HERBICIDA</p> <p>Una alternativa inteligente</p>	<p>TordonXT™ 26 SL HERBICIDA</p> <p>Tradición y confianza</p>



SOMOS SU ALIADO CONFIABLE EN EL CONTROL DE MALEZAS EN POTREROS, MANTENIENDO LA TRADICIÓN Y LA CALIDAD

8 PASOS DEL ÉXITO DE SUPER GANADERÍA™

- 1 Identifique las malezas ms abundantes en sus potreros, use las dosis y métodos de aplicación recomendados por un Asesor Técnico o un distribuidor de Corteva Agriscience™.
- 2 Utilice el equipo de aplicación adecuado, ya sea para aplicaciones totales o en manchones, y no olvide usar equipo de protección.
- 3 Pastorear el potrero antes de aplicar el herbicida.
- 4 Prepare correctamente la mezcla, use el agua lo ms limpia posible. Siempre utilice el equipo de protección adecuado (guantes, overol, lentes de seguridad y botas).
- 5 Aplique el producto cuando la maleza esté creciendo vigorosa -mente. No aplique si la planta está en floración, fructificación o sequia.
- 6 Asegúrese que todas las partes de la maleza queden bien aplicadas.
- 7 Aplique con buen clima, evite hacerlo si se esperan lluvias próximas a la aplicación. Trate de aplicar en las horas ms frescas del día.
- 8 Espere a que el pasto se recupere y ocupe el espacio que dejó la maleza. Evite sobrepastorear los potreros.

PARA MALEZAS:

HERBÁCEAS

SEMILEÑOSAS

LEÑOSAS

ARBUSTIVAS

CombatranXT™ 22,5 ME



Mazote o Centavo
Desmodium spp
Dosis de 1.5 l/barril de 200 l
2.25 l/ha o 1.5 l/mz



Caimito
Chrysophyllum mexicanum
Dosis de 4 l/barril de 200 l
6-8 l/ha 1/mz 4-6 l/mz



Guayabito
Psidium guajava
Dosis 3 l/barril de 200 l
5-6 l/ha o 3-4 l/mz



Mimosa
Sarza de playa
Dosis de 1 l/barril de 200 l
1.5 l/ha o 1.0 l/mz



Subin o espino blanco
Acacia farnesiana
Dosis de 2.5-3 l/barril de 200 l
3.25 -4 l/ha o 2.5-3 l/mz

Pastar™ D 36 SL



Maní o frijolillo
Senna obtusifolia
Dosis de 1 l/barril de 200 l
1.5 l/ha o 1.0 l/mz



Dormilona o sensitiva
Sida rhombifolia
Dosis 1 l/barril de 200 l
1.5 l/ha o 1 l/mz



Dormilona o sensitiva
Mimosa pudica
Dosis 1 l/barril de 200 l
1.5 l/ha o 1 l/mz



Zarza cola de iguana
Dormilona o sensitiva
Dosis 1 l/barril de 200 l
1.5 l/ha o 1 l/mz

TordonXT™ 26 SL



Dormilona
Sarza de playa
Dosis 2 l/barril de 200 l
3 l/ha o 2 l/mz



Manía o frijolillo
Senna obtusifolia
Dosis 2 l/barril de 200 l
2.5 a 3 l/ha o 2 l/mz



Escoba suave o Escobilla
Sida rhombifolia
3.75 L/ha (1.25% v/v)



Tagete
Amaranthus spp.
Dosis 1 a 1.5 l/barril de 200 l
1.5 a 2.25 l/ha o 1.5 l/mz

Dominum™ 12 EO



Cinco negritos
Lantana camara
1.5-1.8 L/ha
0.5% - 0.625% v/v




Raspa guacal
Tetracera volubilis
1.50% v/v (4.5 L/ha)



Ixcanal o Cacho de Toro
Acacia cornigera
4,5 L/ha (1,50% v/v)



Sida
Sida hirsutissima
0.05%-0.62% v/v ó 1.5 - 1.8 L/ha



Caimito
Chrysophyllum mexicanum
5 L/ha (200% v/v)

Tronador™ D 18,9 SL



Abejón o quiebra platos
Senna obtusifolia
3 L/ha (2,1 L/mz) (1% v/v)




Zarza Dormilona
Mimosa pudica
3 L/ha (2,1 L/mz) (1% v/v)



Pejosa o Jazmín de río
Cleome viscosa
3 L/ha



Frijolillo
Senna occidentalis
3 L/ha (2,1 L/mz) (1% v/v)



Flor amarilla
Baltimorea recta
3 L/ha (2,1 L/mz) (1% v/v)

Terrano™ D 18,9 SL




Abejón o quiebra platos
Senna obtusifolia
3 L/ha (2,1 L/mz) (1% v/v)



Zarza Dormilona
Mimosa pudica
3 L/ha (2,1 L/mz) (1% v/v)



Zarza cola de iguana
Mimosa albida
(2.25-3) L/ha



Frijolillo
Senna occidentalis
3 L/ha (2,1 L/mz) (1% v/v)



Flor amarilla
Baltimorea recta
3 L/ha (2,1 L/mz) (1% v/v)

Recomendaciones:

Recomendaciones:

Recomendaciones:

Recomendaciones:

Recomendaciones:

Recomendaciones:
