


Un SuperGanadero aumenta su productividad



Este producto no daña el pasto.
Es confiable para el ganado, siempre que siga las instrucciones de uso de acuerdo a la etiqueta.

Beneficios que ofrecemos

1. Asesoría técnica especializada
2. Las soluciones más avanzadas tecnológicamente
3. Capacitaciones continuas.



SuperSelectivo: potreros limpios, forraje abundante.

Crosser™ D 18,9 SL

HERBICIDA

Excelente control, quemado más rápido y uniforme de la maleza.



Categoría Toxicológica 5 - Franja Verde
Teléfonos de Emergencia: Guatemala: (502) 2230-0807 - (502) 2232-0735 / Honduras: (504) 2232-2322 / Panamá: (507) 523-4948
Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

PAIS
Panamá
Guatemala
Honduras

No. de Registro
9262
479-130A
1170-582-1



Visítanos en www.corteva.com
TM © Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2020 Corteva



Crosser™ D 18,9 SL

HERBICIDA

Es un herbicida sistémico y selectivo a los pastos para el control de malezas herbáceas y semi-leñosas que invaden los potreros. **Crosser™ D 18,9 SL** pertenece a la familia Súper Ganadería™.



Recomendaciones de uso

País	Cultivo	Malezas	Dosis	Observaciones
Guatemala Panamá Honduras	Pasturas	Pegajosa o jazmín de río <i>Cleome viscosa</i>	3 L/ha (2,1 L/mz) 1% v/v	El volumen empleado debe ser suficiente para lograr un mojado adecuado del follaje de la maleza.
		Frijolillo <i>Senna occidentalis</i>		En aplicaciones localizadas se debe alcanzar el punto de goteo en las malezas tratadas, mientras que en aplicaciones generalizadas el volumen de aplicación debe oscilar entre 300 y 400 litros de agua por hectárea. En ambos casos, el volumen empleado debe ser suficiente para lograr un mojado adecuado del follaje de la maleza.
		Dormilona <i>Mimosa pudica</i>		Las aplicaciones deben realizarse sobre malezas expuestas que se encuentren en estado de desarrollo vegetativo, antes de su floración. No se debe aplicar Crosser™ D 18,9 SL sobre maleza que se encuentra en estado de floración o cuando haya sufrido estrés (por falta de humedad o por alguna otra causa).
		Abejón o quiebra platos <i>Senna obtusifolia</i>		
		Flor amarilla <i>Baltimora recta</i>		
		Zarza cola de iguana <i>Mimosa albida</i>	2,25 – 3,0 L/ha (1,57 – 2,1 L/mz) 0,75 – 1 % v/v	Se debe usar la dosis mayor cuando la maleza se encuentre en estado avanzado de desarrollo o cuando el porcentaje de infestación sea superior al 40%.

Beneficios de usar Crosser™ D 18,9 SL



- Selectivo y confiable.
- Mejor control y más productividad.
- Rápido quemado y control de la maleza.
- Perfil toxicológico y ambiental más amigable.
- Mejor control de malezas que el 2,4-D.
- No daña el pasto, siempre y cuando se use según las recomendaciones en etiqueta.
- Excelente compatibilidad con otros herbicidas.

Principales malezas que controla Crosser™ D 18,9 SL



Los 8 pasos del éxito de Súper Ganadería en la aplicación de Crosser™ D 18,9 SL

